

Aquest fulletó li proporciona la informació necessària sobre els **tràmits i normes** a seguir en relació a la intervenció quirúrgica a la que serà sotmès.

Si té qualsevol dubte o pregunta sobre qualsevol d'aquestes o altres punts, **NO DUBTI** de dirigir-se al personal de la consulta externa d'urologia.

## Protocol Intervenció Quirúrgica Hidrocele

i

- \*Consentiment Informat
- \*Normes a seguir
- \*Recomanacions
- \*Signes d'alerta

## QUÈ és un Hidrocele?

És una cavitat de contingut líquid que envolta el testicle. La intervenció es du a terme habitualment mitjançant una incisió a l'escrot.

---

## QUAN es decideix si l'operen?

El/la metge/ssa l'informarà durant la visita de si vostè serà o no intervingut.

Haurà de llegir un document anomenat *CONSENTIMENT INFORMAT* i signar-lo si està d'acord amb el mateix.

A partir d'aquest moment vostè serà programat per a la intervenció quirúrgica.

Se li indicaran dos dies per fer les proves preoperatories.

---

## QUIN dia li fan les proves necessàries (preoperatori) i quin dia l'operen?

Un dia li faran la visita d'infermeria, anàlisi de sang i radiografia. Ha de venir en dejú (5-6 hores) i amb la llista de tota la medicació que està prenent actualment.

Un altre dia (aproximadament al cap d'una setmana) el visitarà el/la metge/ssa anestesiòleg/a per valorar el resultat de les proves.

El trucarem per telèfon per dir-li el dia que ha d'ingressar.

## COM preparar-se per la intervenció

Ha d'estar en dejú durant 8 hores abans de l'ingrés (inclòs no beure aigua).

Recordi portar la medicació que està prenent actualment.

---

## RECOMANACIONS a l'alta

Portar roba interior (slip) ben ajustat.

S'ha de dutxar, deixant que caigui l'aigua i el sabó.

Després s'ha d'assecar bé amb una gasa estèril o amb un assecador d'aire i aplicar un antisèptic (Povidona Yodada).

Ha de tornar a la visita del/de la metge/ssa especialista (Uròleg/a) que li han programat per control.

Ha de passejar. No ha de fer repòs al llit.

Ha de seguir la seva dieta habitual.

Si abans de la intervenció seguia algun tractament farmacològic, segueixi prenent la mateixa medicació, si no és que se li indica el contrari.

S'ha de prendre la medicació analgèsica que li ha prescrit el/la metge/ssa, si té dolor.

## SIGNES d'alerta

Temperatura superior a 38°

Si la ferida està calenta, indurada o si supura molt freqüentment líquid o sang

Si té molt dolor i aquest no cedeix amb l'analgèsic que li han receptat



**SERVEI D'URGÈNCIES:**  
Telèfon: 93 306 99 00  
24h