

Aquest fulletó li proporciona la informació necessària sobre els **tràmits i normes** a seguir en relació a la intervenció quirúrgica a la que serà sotmès/a.

---

Si té qualsevol dubte o pregunta sobre qualsevol d'aquests o altres punts, **NO DUBTI** de dirigir-se al personal de la consulta externa d'urologia.

## Protocol Intervenció Quirúrgica RTU (Resecció transuretral)

i

- \**Consentiment Informat*
- \**Normes a seguir*
- \**Recomanacions*
- \**Signes d'alerta*

## **QUÈ** és una RTU?

La RTU (Resecció transuretral) és l'extracció de fragments de pròstata o teixit vesical amb un aparell (resector) que s'introdueix per la uretra.

---

## **QUAN** es decideix si l'operen?

El/la metge/ssa l'informarà durant la visita de si vostè serà o no intervingut.

Haurà de llegir un document anomenat **CONSENTIMENT INFORMAT** i signar-lo si està d'acord amb el mateix.

A partir d'aquest moment vostè serà programat per a la intervenció quirúrgica.

Se li indicaran dos dies per fer les proves preoperatories.

---

## **QUIN** dia li fan les proves necessàries (preoperatori) i quin dia l'operen?

Un dia li faran la visita d'infermeria, anàlisi de sang i radiografia. Ha de venir en dejú (5-6 hores) i amb la llista de tota la medicació que està prenent actualment.

Un altre dia (aproximadament al cap d'una setmana) el visitarà el/la metge/ssa anestesiòleg/a per valorar el resultat de les proves.

El trucarem per telèfon per dir-li el dia que ha d'ingressar.

## **COM** preparar-se per la intervenció

Ha d'estar en dejú durant 8 hores abans de l'ingrés (inclòs no beure aigua).

Recordi portar la medicació que està prenent actualment.

---

## **QUÈ** pot passar després de l'operació?

Pot tenir petits trastorns deguts a la retirada de la sonda: coïssor, sagnat, imperiositat, incontinença, ... que aniran desapareixent amb el temps.

---

## **RECOMANACIONS** a l'alta

S'ha de dutxar.

Ha de passejar. No ha de fer repòs al llit.

Ha de seguir la seva dieta habitual. Beure força quantitat de líquids (aprox. 2 litres al dia).

Si abans de la intervenció seguia algun tractament farmacològic, segueixi prenent la mateixa medicació, si no és que se li indica el contrari.

Ha de tornar a la visita del/de la metge/ssa especialista (Uròleg/a) que li han programat per control.

## **SIGNES** d'alerta

Temperatura superior a 38°

Orina molt hemàtica

Si té molt dolor i aquest no cedeix amb l'analgèsic que li han receptat

No poder orinar durant 6 hores i/o amb dolor abdominal



**SERVEI D'URGÈNCIES:**  
Telèfon: 93 306 99 00  
24h